

واکسیناسیون طیور روستایی با واکسن نیوکاسل مقاوم به گرما

ترکیب: این واکسن محتوی ویروس غیر بیماری زای مقاوم به گرما نیوکاسل می باشد.

دلیل مصرف: این عملیات برای ایمن سازی فعال علیه بیماری نیوکاسل در طیور روستایی طراحی شده است.

دوز و نحوه مصرف به روش آشامیدنی:

- واکسن در آب آشامیدنی حل می شود.
- آب مورد استفاده بایستی خنک (۲ تا ۸ درجه سانتی گراد) و بدون سختی یا املاح باشد.
- آب مورد استفاده حاوی پودر تثبیت کننده با دوز مناسب باشد.
- ظرفی که حاوی واکسن بوده و یا واکسن با آن حمل و خورانده می شود، هرگز فلزی نباشد.
- ظرف و آب مورد استفاده هرگز با ضدعفونی کننده یا دترجنت (مایع ظرفشویی یا دستشویی) در تماس نباشد.
- هر ویال ۵۰۰ دوزی در ۱۰۰۰۰ سی سی (۱۰ لیتر) آب مناسب با شرایط ذکر شده حل شود. بدین ترتیب هر ۲۰ سی سی از آب، حاوی یک دوز واکسن مناسب برای یک پرنده می باشد.

توصیه های لازم در مایه کوبی:

- این واکسن برای طیور روستایی در تمام سنین توصیه می شود.
- قبل از مایه کوبی از سلامت پرنده اطمینان حاصل کنید.
- حتی الامکان پرندگان را به طور همزمان مایه کوبی کنید.
- این واکسن را با هیچ یک از واکسن های زنده دیگر مخلوط نکرده، فاصله زمانی مایه کوبی دو واکسن متفاوت، رعایت شود.

موارد منع مصرف:

- پرندگانی که از نظر کلینیکی بیمار و یا در اثر حمل و نقل، ضعیف شده یا علائم بیماری دارند نباید مایه کوبی شوند.

احتیاطات لازم:

- واکسن حل شده بهتر است در مدت ۲ ساعت مصرف شود. اگر چه در دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد قابلیت نگهداری تا ۱۲ ساعت را نیز دارد.
- در واکسیناسیون به روش آشامیدنی، پرندگان باید حداقل ۲ ساعت قبل از واکسیناسیون از دسترسی به آب محروم شوند تا در زمان دریافت واکسن تشنه باشند.
- هرگز واکسن را در معرض نور مستقیم خورشید و یا حرارت قرار ندهید.
- از آنجایی که این واکسن محتوی ویروس زنده است، ویال های خالی و یا ویال هایی که باز شده ولی به طور کامل مصرف نشده اند، باید در محلول ضدعفونی کننده قوی غوطه ور شوند.
- ویال های خالی به همراه فرم های تکمیل شده واکسیناسیون توسط مسئول فنی بهداشتی، دهیاران و شوراهای دامپزشکی شهرستان جعفرآباد تحویل گردد.
- شرایط نگهداری:** با وجود تحمل واکسن نسبت به گرما، در دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد و دور از نور حمل و نگهداری شود.